

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΈΝΔΕΙΞΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗΣ;

Α. Τσολαρίδης, Γ. Νικολάτος, Ι. Αβούρης, Κ. Χαψή, Π. Σωτηροπούλου, Δ. Γκανέτσος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναφέρονται οι προβληματισμοί και η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση του περιαμυγδαλικού αποστήματος. Η παρούσα μελέτη αφορά 125 περιαμυγδαλικά αποστήματα, που αντιμετωπίστηκαν με διάνοιξη και παροχέτευση, στο τμήμα μας την τελευταία 5ετία.

Στα 42 περιστατικά (ποσοστό 33,5%) ακολούθησε αμυγδαλεκτομή, μετά 20-30 ημέρες.

83 περιστατικά δεν υποβλήθηκαν σε αμυγδαλεκτομή. Το περιαμυγδαλικό απόστημα υποτροπίασε σε 7 περιστατικά (ποσοστό 8,5%)

Άποψη μας είναι ότι δεν απαιτείται αμυγδαλεκτομή μετά το περιαμυγδαλικό απόστημα, παρά μόνο παρακολούθηση του ασθενούς, για τους επόμενους 1-2 μήνες.