

# ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Σ. Γεωργόπουλος, Ι. Αβούρης, Χ. Λατούφης, Α. Τσολαρίδης, Π. Σωτηροπούλου, Γ. Νικολάτος, Δ. Γκανέτσος.

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και τοξικότητας της σύγχρονης χορήγησης ριζικής ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που κρίθηκαν μη χειρουργήσιμοι.

Μελετήθηκαν 8 ασθενείς, όλοι άνδρες, ηλικίας 60 μέχρι 75 ετών (μέση τιμή 67 έτη), 4 των οποίων είχαν εντόπιση στον λάρυγγα, 2 στην στοματική κοιλότητα και 2 στους παραρρινίους κόλπους.

Χορηγήθηκε Docetaxel 20 mg σε i.v έγχυση μίας ώρας μετά κατάλληλη προετοιμασία με κορτικοειδή ανά εβδομάδα καθ' όλη την διάρκεια της ακτινοθεραπείας (5000-6000 rads σε 30 συνεδρίες).

Η τοξικότητα της χημειοθεραπείας ήταν μέτρια, καλά ανεκτή και δεν επηρέασε την χορήγηση της ακτινοθεραπείας (συνεδρίες και σύνολο χορηγούμενης δόσης).

Σε 5 ασθενείς (62,5%) παρατηρήθηκε πλήρης ύφεση, σε 3 (37,5%) μερική ύφεση της νόσου.

Η μέση επιβίωση όλων των ασθενών μετά το πέρας της θεραπείας είναι δεκατρείς μήνες.

Συμπερασματικά η σύγχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας (Docetaxel) και ριζικής ακτινοθεραπείας σε τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή. Χρειάζεται όμως τυχαιοποιημένη μελέτη με μεγάλο αριθμό ασθενών για τελικά συμπεράσματα