

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

Γ. Νικολάτος, Σ. Γεωργόπουλος, Ι. Αβούρης, Α. Τσολαρίδης, Κ. Χαψή, Δ. Γκανέτσος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είναι γνωστό ότι τα κοκκιώματα των φωνητικών χορδών μπορεί να οφείλονται σε διασωλήνωση, κακή χρήση φωνής ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Σε 53 ασθενείς που εξετάσθηκαν στο Ω.Ρ.Λ τμήμα του Γ.Ν.Ν. Αθηνών «ΕΛΠΣ» την τελευταία 3ετία διαπιστώθηκε ότι 26 εκ των ασθενών έχουν κλινική εικόνα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Στους ασθενείς αυτούς χορηγήθηκε ομεπραζόλη 40 mg για χρονικό διάστημα 8 εβδομάδων. Αναφέρονται τα αποτελέσματα τα οποία σε 18 ασθενείς ήταν αρκετά ικανοποιητικά σε τρόπο ώστε οι ασθενείς αυτοί να μην υποβληθούν σε άλλες θεραπευτικές μεθόδους όπως π.χ. χειρουργική θεραπεία.